

► MASQUE CHIRURGICAL

Masque adapté à la protection vis-à-vis des projections de gouttelettes des voies aériennes supérieures.

Depuis le 03/03/20, il est demandé aux professionnels du CHBA de **porter un masque chirurgical**.

► Comment mettre correctement le masque Chirurgical ?




Déplier le masque ;
La face absorbante est
à appliquer sur la bouche.



Positionner le masque sur le
nez et ajuster la barrette au
contour du nez.



Assurez vous de l'étanchéité du
masque : le nez et le
menton doivent être couverts.



Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait.

Puis faire une Hygiène des mains par friction avec un produit hydro- alcoolique.



► Quand changer le masque ?

- au moins toutes les 5 heures,
- en cas de souillures, de projections, s'il est mouillé,
- s'il a été touché (**ne pas le repositionner**).

► RAPPEL :

Faire porter un masque chirurgical aux patients
symptomatiques : en présence de soignants et en dehors
de sa chambre.

► MASQUE FFP2

Masque de filtration inspiratoire.



Pour la prise en charge des cas suspects, cas possibles et cas confirmés mettre en place les Précautions GOUTTELETTES adaptées COVID du 10 03 2020.

Le port de masque respiratoire FFP2 est à utiliser exclusivement pour les soins respiratoires invasifs :

INDICATIONS



- Prélèvements nasopharyngés
- Aspirations bronchiques
- Kiné respiratoire
- Endoscopies bronchiques, gastrique ou ORL...



Il n'y a aucune indication justifiant le port du masque FFP2 pour les professionnels dans les couloirs.

SÉCURITÉ

Il est important de vérifier l'étanchéité du masque par un test d'ajustement (fit-check).



Inspirer pour vérifier la dépression de la chambre du masque.