

FICHE TECHNIQUE
PRÉCAUTION GOUTTELETTESPour tous patients symptomatiques :
Fièvre avec signes respiratoires toux, essoufflement et douleur thoracique

COVID-19

Transmission* GOUTTELETTES des voies aériennes supérieures d'un sujet contaminé
Transmission par aérosol évoquée
MAINS et SURFACES souillées par les sécrétions d'un sujet infecté

Mesures barrières PRECAUTIONS GOUTTELETTES et CONTACT
Isolement géographique selon un circuit défini
Patient : masque chirurgical et hygiène des mains
Soignant : masque Chirurgical, lunettes, tablier, et hygiène des mains

Environnement Bionettoyage surfaces hautes et équipements réutilisables
avec un détergent désinfectant habituel
Déchets /Linge : filière DASRI /filère linge contaminé

PROTECTION DU SOIGNANT :

Masque et lunettes assurent la protection des portes d'entrées : conjonctives et sphère ORL

Le port du tablier protège la tenue et permet d'avoir les avant bras dégagés pour réaliser une friction SHA efficace des mains et des avants bras.

PATIENT :

Masque chirurgical limite les projections dans l'environnement et protège les personnes présentes à ses cotés.

HABILLAGE DES PROFESSIONNELS

S'effectue avant d'entrer dans la chambre/ box (en dehors de la présence patient)

Tenue professionnelle (tunique et pantalon), ou à défaut, enfiler une tenue à usage unique

1. Placer un masque chirurgical
2. Réaliser un geste d'hygiène des mains par friction avec le SHA
3. Mettre un tablier
4. Mettre systématiquement des lunettes de protection



Pour tout risque de contact avec les liquides biologiques ou manipulation de piquant/tranchant : enfiler des gants non stériles à usage unique

L'absence de bijoux et les avant bras dégagés facilitent la réalisation des frictions avec les SHA

Demander au patient de porter un masque chirurgical en présence d'un soignant

POUR LES SOINS RESPIRATOIRES INVASIFS

Aspiration bronchique, prélèvement nasal, kiné respiratoire, ... :

Porter un appareil de protection respiratoire masque FFP2.

Vérifier son étanchéité par un test d'ajustement (fit-check)



Inspirer pour vérifier la dépression de la chambre du masque

DESHABILLAGE DES PROFESSIONNELS

En sortant de la chambre / pièce :

1. Enlever le tablier et + ou - gants, puis se frictionner les mains avec SHA en remontant sur les avant bras
2. Retirer les lunettes et le masque chirurgical puis Se frictionner les mains avec SHA



Elimination des Déchets : Filière DASRI Habituelle Banalisation

